

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷二百八十七

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣楊懋珩

校對官中書臣潘庭筠

謄錄監生臣張德燾

欽定四庫全書

普濟方卷二百八十七

明

周王朱橚撰

癰疽門

癰內虛

夫癰內虛者榮衛腐為膿血經絡不足則五臟之氣虛之也其證多生虛熱而心神為之驚悸以癰熱不散乘虛而入又心獨惡熱故驚悸不定也

方

黃芪散

出聖惠方

治癰內虛不足膿水不絕四肢乏力不

能飲食久不瘥必為內漏

黃芪

剉一兩

山茱萸

五味子

各半兩

白茯苓

去黑皮三分

當歸

切焙半兩

石斛

去根三分

遠志

去心焙一兩

附子

炮去皮臍

天

去心

肉蓯蓉

酒浸切焙

麥門冬

去心焙

熟乾地黄

焙各一兩

絲子

酒浸三日

焙乾半兩為末

人參

三分

石常

去毛一兩

白芍藥

窮

半兩

甘草

炙剉三分

右為散每服二錢荊芥湯調下日三四服一方有地

脈半兩

肉蓯蓉散

出聖惠方

治癰經年不瘥膿血過多補虛

乾薑炮

半兩

巴戟天

去心一兩

菟絲子

酒浸別搗三分

肉蓯蓉

酒浸

切焙二兩

遠志

去心

人參

各一兩

甘草

炙

麥門冬

去心焙各二兩

石

常

去毛

白芍藥

桂

去麤皮

芎藭

各一兩

熟乾地黃

焙去一兩

半

山茱萸

當歸

切焙各二兩

五味子

二兩

附子

炮製去皮臍二

兩

白茯苓

去黑皮一兩半

右為散每服二錢荊芥湯調下空心食前服一方有

地黄三分

五香丸

出聖惠方

治癰膿血至甚不生肌肉內補

沉香

乳香

木香

藿香葉

丁香

續斷

各一

兩

白芍藥

一兩

熟乾地黄

兩

焙二

附子

炮製去

皮臍

石長生

各一兩

敗醬

人參

白茯苓

去黑皮

厚朴

去粗皮

薑汁炙

半一兩

鹿角屑

虎脰骨

酥炙黃

各二兩

薰陸香

一兩

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服三十丸以白湯下

蜀椒散

出聖濟總錄

治癰內虛

蜀椒

去目并閉口炒出汁半兩

熟乾地黄

焙

白欬

防風

黃

芩

去黑心

人參

桂

附子

去皮臍焙乾各一兩

芎藭

甘草

炙各一兩

赤小豆

一合炒令熟

右為散每服二錢溫酒調下早晚食前服

熟地黄散

出聖惠方

治癰疽發背發乳大去血膿後內虛

少氣

熟乾地黄

黃芪

剉

人參

去蘆頭各一兩

當歸

半兩剉碎微炒

芎

窮^二白芍藥^{兩半}白茯苓^{兩一}甘草^{兩半}桂心^{兩半}麥

門冬^{去心續斷各一兩}

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服日三四服之效

人參散^{出聖惠方}治癰疽內虛不足

人參^{一兩去蘆頭}黃芪^{二兩剉}甘草^{半兩炙}當歸^{白芍}

藥^{兩半}熟乾地黄^{兩二}白茯苓^{兩一}桂心^{兩半}枸杞子^{兩一}白

朮^{兩一}

右為散每服四錢水一中盞入生薑汁半分棗三枚煎至六分去滓不拘時溫服

黃芪散

出聖濟總錄

治癰潰漏血空竭內塞痛

黃芪

劉芍藥

細辛

去苗葉

瞿麥穗

白芷

薏苡

仁人參

附子

炮去皮臍

熟乾地黄

焙各一兩

赤小豆

二合

右為散每服二錢空心溫酒調下晚再服痛甚加芍

藥口乾加薏苡仁膿多加黃耆

黃耆湯

出聖濟總錄

治癰疽內虛

黃耆

剉

人參

甘草

剉

白朮

遠志

去心

半兩

芍藥

各

當歸

切焙各一兩

熟地黄

焙

白茯苓

去黑皮

桂

去麋皮

各三分

右麋搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎乾

棗三枚劈破同煎至八分去滓空心溫服日晚再服

生地黃湯

出聖濟總錄

治癰內虛熱

生乾地黃

切焙二兩

人參

一兩

芍藥

一兩

白茯苓

去黑皮

芎藭

各

一兩當歸

切焙二分

黃芪

剉一兩

黃芩

去黑心

木通

剉二分

各

各

右麋搗篩每服五錢水一中盞半入竹葉七片棗二

枚劈破同煎至八分去滓空心溫服日晚再服之

排膿生肌散

出聖惠方

治癰發背膿不止內虛

當歸

劉微炒

黃耆

劉各半兩

人參

一兩去盧頭

芎藭

半兩

厚朴

一兩

去皮生薑汁炙香熟

防風

半兩去盧頭

白芷

半兩

桔梗

半兩去盧頭

甘草

半兩炙微赤剉

右為細散每服二錢以木香湯調下日三四服

癰潰後

附論

夫癰者由寒氣客於肌肉血氣結聚乃成癰也癰潰之

後有逆順其眼白睛青黑而眼小者一逆也服藥而嘔者二逆也傷痛渴甚者三逆也有體中不便者四逆也音嘶色脫者五逆也此五者並為逆也腸胃受冷而變下利利則腸胃俱虛而冷搏於胃氣則變嘔逆氣若不通遇冷折之則變噦也

方

黃耆散

出聖惠方

治癰潰後補虛去客熱

黃芪

二兩剉

知母

二兩

石膏

二兩

白芍藥

麥門冬

去心各一

兩甘草半兩灸白茯苓桂心川升麻熟乾

地黃人參去蘆頭各一兩

右為麤散每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服

日三四服

梔子散出聖惠方治癰已潰後散腫氣

梔子仁一兩川大黃二兩黃連去鬚白芨牡礪白歛

木通剉川升麻黃芩各一兩

右為細散每用以鷄子白調塗故帛上貼腫處燥復

易之

內塞散 療癰疽潰漏血脉空竭

黃耆 細辛 芍藥 薏苡仁 白芷 瞿麥

各二

兩

赤小豆 乾地黄 人參 防風

各一兩

右先以新成白苦酒置新器中內赤小豆須臾出銅器中熬令燥復須內苦酒中更熬下五九及止合搗為散酒服方寸七日夜六七度腹痛甚倍芍藥口未閉倍薏苡仁膿多倍黃芪忌生菜葱蒜等物

洗藥猪蹄湯

藁本

去苗

當歸

去蘆

杜獨活

去蘆

蘭草

一方作茴香

黃連

去鬚

薔薇根

狼牙草

甘草

大黃

芍藥

各二兩

右為麤末先用豬蹄前蹄一隻煮取濃汁澄去滓肉與上面油花每用藥末半兩蹄汁一椀葱白一根漢椒二十餘粒同煎三五沸去滓熱通手遂洗之

黃芪茯苓湯

出千金方

治癰疽潰後膿大多虛熱

黃芪

麥門冬

各三兩

五味子

四合

芎藭

二兩

生薑

四兩

茯苓

苓一兩桂心二兩大棗二十枚

右為麤咬咀以水一斗半煮取四升分六服千金翼
有遠志當歸人參各二兩甘草六兩

猪蹄湯

出經
驗方

治一切癰疽腫毒消毒去惡肉凡瘡

有口便用此洗

香白芷

不見
火切

生甘草 老羌活

露蚌房

取有
兒者

黃

芩

去
心

赤芍藥

去
皮

川當歸

去蘆洗
焙

各等分

右為麤末看疽大小用藥如疽大加料用先將豬

前蹄兩隻一斤只用白水二升煮軟將汁分為兩次
澄去面上油花并下面滓肉每次用藥一兩投於汁
中再用文武火煎十數沸去滓以故帛蘸藥湯候溫
徐徐揩瘡上死肉惡血隨洗而下淨洗訖以故帛挹
乾仍避風忌人口氣吹之有狐臭人并現行月經婦
人尤不許入病人房洗瘡切勿以手觸看洗疽之方
所傳甚多惟此方極神效其用露蚌房極有理蓋以
毒去毒也一方無羗活澹寮方無黃芩

猪蹄洗湯 療癰疽等毒潰爛

猪蹄

一具治
如食法

薔薇根

一斤甘草

五兩

芍藥

五兩

白芷

五兩

右以水二斗煮猪蹄取八升去滓下諸藥味取四升

稍稍洗瘡上

洗肌散 治膿水不乾者以藥夾黃葱洗之

青木香 白欬 檳榔 貫衆 荊芥

右同煎洗之甚妙

白芷摩膏 療疽已潰

白芷

甘草

各二分

烏頭

三分

薤白

十五挺

青竹茹

雞子大一

子一

枚

右以猪膏一升合煎白芷黃膏成絞去滓塗瘡四邊

勿著瘡中

白欬湯

出聖惠方

治癰腫已潰後結強宜搨方

白欬

黃芩

赤芍藥

丹參

各一兩

右藥細剉以水三升煮至一升半以帛浸搨腫上頻

頻換之為妙

白芷散

出聖惠方

治癰瘡已潰

白芷黃連

去鬚地榆
判各一兩

右為細散以鷄子白調塗布上貼日三四度換之

去水膏

出直指方

治癰疽破穴後誤入皂角水及諸毒水

以致疼痛

甘草

一分生為末

砂糖

糯米粉

各三分

右為膏攤在絹上貼之毒水自出驢馬汗及尿糞一切毒水皆法之

治癰瘡潰後爛方

出聖惠

取陳久醬汁和麵搽瘡上日三易之

治癰後流膿不盡或更移結腫松脂封方

出聖惠方

以松脂蠟等分同溶成汁密封之

久癰

附論

夫人之肌肉皮膚待血氣以溫養癰久不瘥熱毒未盡風冷乘之客於瘡孔肌不得溫故腫結不消乍瘥乍發名曰久癰不治則變成癰

方

五香連翹丸

出聖濟總錄

治諸癰腫熱毒蘊積或久出膿

水煩熱疼痛瘡口不合排膿去死血

木香

一兩半

沉香

剉

人參

雞舌香 乳香 芍藥

玄參

海藻

洗去鹹汁各一兩

當歸

切焙

連翹 麝香

研半兩

桂皮

大黃

剉

芒硝

研各一兩

惡實

二兩

仁炒黃

一兩半

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十九至三十

丸空心酒下量虛實加減

黃耆散

出聖惠方

治癰久出膿水過多四肢虛羸

黃耆

一兩到

敗醬

三分

絡石

一兩

防風

三分去蘆頭

漏蘆

一兩

白

欬

三分

白薇

一兩

玄參

三分

白茯苓

三分

白芍藥

一兩

沉香

藿香

各三分

熟乾地黄

一兩

甘草

半兩炙微赤剉

右為麤散每服四錢水一中盞煎至六分去滓溫服

日三四服之

占斯散

出聖惠方

治久癰及風毒留積穿穴久出膿水疼

痛生肌肉補虛

占斯黃耆

剉各半兩

細辛木香

連翹

桔梗

去蘆

頭

芎藭

甘草

炙微赤剉

白芍藥

續斷

人參

去頭蘆

獨活

各一兩

熟乾地黄

半兩

右為細散每於食前以粥飲調下二錢

木香湯

出聖惠方

治一切癰疽及乳癰風腫留積疼痛不

止或膿水不快久不生肌

木香乳香

鷄舌香

各半兩

沉香

射干

連翹

升麻 黃耆劉 獨活去蘆頭 木通 桑寄生劉 甘

草

劉灸

大黃

劉炒各三分

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至一盞下芒硝五分麝香半字更煎一二沸濾去滓空心溫服不利再服

蛭皮散

出聖濟總錄

治一切癰疽諸瘻拔毒氣生肌肉止

膿血

蛭皮

杜仲

劉炒

厚朴

去粗皮薑汁炙透各一兩

續斷

地榆

藁本去土附子炮去皮臍當歸切焙桂去麁皮小露蚌房半枚

炙

右為散每服二錢溫酒調晚再服

麥門冬湯 一名內補散

麥門冬去心焙黃耆炙剉五味子炒白茯苓去黑皮芎

藟去粗皮桂各半兩當歸切焙人參甘草炙各三分遠志去心

焙一兩

右麁搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎大

棗二枚擘開同煎至一盞濾去滓空心溫服晚再服

生肌膏取瘡

殺蟲散

出聖惠方

治癰疽發背久不瘥

白蕪荑

藜蘆

去蘆頭

雌黃

細研各一兩

麝香

一分細研

青礬

半兩雄黃

半兩細研

苦參

一兩剉

附子

半兩炮裂去皮臍

右為細散與麝香相和研勻每用時先以吳藍甘草

煎湯洗瘡口去痂乾日二傳之

麥門冬散

出聖惠方

治久癰膿水出不盡心中煩悶不已

麥門冬

一兩
去心

紫葛

三分
剉

木通

一兩
剉

黃耆

一兩
剉

川升

麻

三分
犀角屑

甘草

半兩
炙

微赤
剉

右為麤散每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘

時溫服之

白鮮皮湯

出聖濟
總錄

治癰疽日月久遠膿水不盡心中

煩悶

白鮮皮

桑根白皮

剉

玄參

漏蘆

去蘆
頭

升麻

各一

兩犀角屑

半兩

敗醬

三分

換新藥瘡甚者厚攤貼之

黃耆湯

出聖濟總錄

治癰疽惡瘡久遠膿水不盡變為癰

黃耆

剉炒一兩

升麻

半兩

犀角

鎊半兩

紫葛

木通

剉各三分

右麤搗篩每服五錢水一中盞半煎至一盞下朴硝

半錢濾去滓空心溫服取利三兩行為度未利再服

如神散

出聖濟總錄

治瘡久不瘥時常痛痒皮縮肉消黃

汁膿血不斷

天南星

炮一兩

草烏頭

炒一兩

礬石

煨半兩

右為散先入熱湯洗次用散子調生油攤紙上貼之

黃連散

出聖濟
總錄

治一切癰疽久不瘥

黃連

去
鬚

滑石

碎各
一兩

右為散先濃煎甘草湯溫洗瘡了拭乾爛嚼胡麻子
傳之後乾貼此散日三易良

又方

出聖濟
總錄

治久癰

巴豆

五枚去心
皮令研細

魚脂

三兩

右先熬脂令沸入巴豆煎攪令勻以瓷盒盛塗瘡

上日三易

又方

出聖濟總錄

巴豆

五枚燒灰令細研

斑猫

五枚燒灰細研

右為散傳瘡上以綿貼之日一

治癰癤潰後膿不斷及諸物刺傷瘡

出聖惠方

硫黃粉

二兩牛筋一片椎碎

右以筋內硫黃中以刺瘡孔內取瘡

治癰疽瘡久不瘥

出聖惠方

右搗篩每服五錢以水一盞半煎至一盞入芒硝半

錢濾去滓空心溫服晚再服稍覺瘡痛即去芒硝

蟾蜍膏

出聖濟總錄

治一切瘡腫癰疽瘰癧等疾經月不瘥

成冷瘻

蟾蜍

一枚去頭用

石硫黃

別研

乳香

別研

木香

桂

去粗皮各半兩

露蚌房

一枚燒灰用

右為末用清油一兩調藥入瓷碗盛於銚子內重煬

熬不住手攪令成膏攤絹上貼之候瘡上清水出更

松脂三兩 薰陸香三兩

右合搗內少許鹽為餅貼瘡上得汁出盡瘡

治久癰塗傳方出聖濟總錄

用白楊葉乾者一握為末傳瘡上日二

又方出聖惠方

用飴糖一分取火溶灌瘡中日三

又方出聖濟總錄

用鶴骨剉半兩為末以猪脂調如糊塗傳瘡上故帛

裏之須臾痒發當有蟲出瘡

治癰久不瘥

用馬齒菜搗汁煎以傅之

癰腫貼熨

附論

凡療暴熱欲成癰腫者所貼熨藥初時熱勢猛盛炎熾難當腫處若有頭即當上貼溫熱膏藥引出其熱毒此乃火就燥之義也四畔赤炊處搗生寒藥貼熨之折伏其熱勢亦如驅逐邪惡撲火之義大生藥勢氣力精全

性味雄壯古來療者不本物理皆通草膏已經油煉氣
味微欲使疔療者敵其勇夫不亦難矣沉癰者壅也要
在疎通若初時便令以黏膏貼熳豈得盡於鬱結不成
膿乎其中若熱氣不甚或熱已衰即任貼膏藥求瘥凡
貼熳腫藥皮厚者以藥塗故軟布着肉貼之腫皮薄者
即隔疎紋穀塗藥熳之熳勿令藥在內着肉或慮藥乾
即皮隨藥起其所換藥腫皮厚者乾換腫皮薄者宜濕
換列諸熳方於後

方

重臺散

出聖惠方

治癰疽一切風毒熱腫發背乳癰等疾

重臺

一兩

黃芪

一兩

川大黃

一兩

洋桃根

三分

硝石

三分半夏

三分白欬

三分莽草

三分丁香

半兩木香

半兩沒藥

半兩

半兩

白芷

半兩

赤芍藥

半兩

右為細末看患大小醋旋調稀稠得所塗故布或踈

絹上日三貼之以腫退為度

大黃散

出聖惠方

治癰瘡不消欲結成癰

方

重臺散

出聖惠方

治癰疽一切風毒熱腫發背乳癰等疾

重臺

一兩

黃芪

一兩

川大黃

一兩

洋桃根

三分

硝石

三分半夏

三分白欽

三分莽草

三分丁香

半兩木香

半兩沒藥

半兩

白芷

半兩

赤芍藥

半兩

右為細末看患大小醋旋調稀稠得所塗故布或踈

絹上日三貼之以腫退為度

大黃散

出聖惠方

治癰瘡不消欲結成癰

裏之須臾痒發當有蟲出瘡

治癰久不瘥

用馬齒菜搗汁煎以傅之

癰腫貼熯

附論

凡療暴熱欲成癰腫者所貼熯藥初時熱勢猛盛炎熾難當腫處若有頭即當上貼溫熱膏藥引出其熱毒此乃火就燥之義也四畔赤炊處搗生寒藥貼熯之折伏其熱勢亦如驅逐邪惡撲火之義大生藥勢氣力精全

性味雄壯古來療者不本物理皆通草膏已經油煉氣味微欲使疔療者敵其勇夫不亦難矣沉癰者壅也要在踈通若初時便令以黏膏貼熳豈得盡於鬱結不成膿乎其中若熱氣不甚或熱已衰即任貼膏藥求瘥凡貼熳腫藥皮厚者以藥塗故軟布着肉貼之腫皮薄者即隔踈紋殼塗藥熳之熳勿令藥在內着肉或慮藥乾即皮隨藥起其所換藥腫皮厚者乾換腫皮薄者宜濕換列諸熳方於後

松脂

三兩

薰陸香

三兩

右合搗內少許鹽為餅貼瘡上得汁出盡瘡

治久癰塗傳方

出聖濟總錄

用白楊葉乾者一握為末傳瘡上日二

又方

出聖惠方

用飴糖一分取火溶灌瘡中日三

又方

出聖濟總錄

用鶴骨剉半兩為末以猪脂調如糊塗傳瘡上故帛

川大黃

生用

黃芩

龍骨

甘草

黃連

去鬚

當歸

剉微

炒

牡蠣

白欬

白芨

赤芍藥

赤石脂

各一兩

右為細末每用猪膽汁調塗於細布上看腫大小貼

之燥則易

寒水石散

出聖惠方

治癰疽熱毒疼痛攻焮肌肉赤色虛

腫手不可近欲成膿及有膿者四畔赤腫

寒水石

二兩

洋桃根

剉一兩

硝石

一兩

木香

半兩

白欬

半兩

丁

香

半兩

榆皮

剉半兩

赤小豆

合一兩

漢防已

半兩

川大黃

一兩

生用

右為細散用頭醋旋調和稀稠得所塗故軟布上貼
瘡頭四畔赤炊處候乾即易之其瘡頭別研波斯青
黛少許水和時以烏翎傳之勿令乾燥

紫葛散

出藥院方

治癰腫及發背有赤腫熱痛不可忍

紫葛

三兩剉

川大黃

三兩生用

白斂

二兩

玄參

二兩

黃芩

二兩

麻

二兩

榆白皮

二兩剉

木通

一兩

赤小豆

五合

黃連

三兩

右為細散以新汲水調如麵糊塗於腫上乾即再塗
勿令燥

玄參散

出聖
惠方

燭癰腫毒熱疼痛

玄參

紫葛

剉

川大黃

生用

木香

卷柏

川芒硝

黃藥

紫檀香

各半
兩剉

右為細散以鷄子白調和稀稠得所薄塗患處有瘡
腫已破者去芒硝

柳木耳餅

出聖
惠方

治癰疽瘡腫熱炊疼痛

柳木耳

龍葵根

剉各
一兩

黃連

三分
去鬚

川芒硝

一兩

麥飯

石

三分燒醋
滓三遍

雄雀糞

一分

乳香

一分

杏仁

一兩其瘡有
頭作孔者湯

浸去皮尖無孔
和皮搗用之

右為細散用漿水和捏作餅子如五文錢厚貼瘡頭
以單帛蓋之日三易

蛇退皮方 治癰疽發背未結膿血散腫氣

蛇蛻皮

二兩
燒灰

鷄子白

三枚

芸臺子

二兩
末

赤小豆

三合
末

米醋

三合

蔓菁子

三合
末

生馬齒莧

一握

竈中黃土

二兩
末

右都研令爛熟用塗腫上乾即易之

大黃散

出聖
惠方

治發癰腫皮剝爛汁流出如火燒熱甚

不可耐貼此令消

川大黃

一兩
生用

赤小豆

一兩
壯礪

黃連

白歛土

瓜根

當歸

剉微炒
各一兩

右為細散每以鷄子白調塗故布上貼腫處燥即易

之

野葛散

出聖
惠方

治癰腫疼痛不止

野葛

剉

川大黃

生

半夏

莽草

川芒硝

白歛

各半
兩

右為細散以豬膽和如膏攤於布上貼腫處乾則易之

清水膏

出聖惠方

治癰疽及一切毒腫堅硬疼痛攻衝四

畔炊腫抽熱毒散腫氣

羊蹄根

剉

川大黃

生剉

黃芩

黃蘗

菴豆粉

各一兩

赤小豆

合一

右為細散用芸臺菜搗汁自然者以蜜少許相和調藥令稀稠得所看四畔腫赤處大小剪生絹攤貼之

厚一錢乾即易

繁柳乾散

出聖惠方

治癰未有頭赤腫疼痛宜貼之

繁柳乾

四兩燒灰

川大黃

一兩生剉

白欬

一兩

白芷

一兩

赤小豆

合二

右為細散以新汲水調如膏塗腫上乾則易之

硝石散

出聖惠方

治癰初結赤腫熱熈急痛熳毒散腫

川硝石

雄黃

研細

白芷

白礬

玄參

各三分

右為細散用生油和蜜調塗痛處乾則易之腫消為

度

水調膏

出聖惠方

治癰腫毒熱赤炊疼痛

川大黃

生用

杏仁

去皮生研如膏

鹽花

各三分

右為細散入杏仁膏都研令勻以新汲水和令稀稠得所旋取塗腫上乾即易之

清涼膏

出聖惠方

治癰初結腫振炊散毒

糯米

半升炒令焦黑於地上出火毒

甘草

二兩生用

右為細散看患大小取雪水調塗腫上燥易之

貼爛方

出聖惠方

治癰發背

槐子

一合慎火草一握

右搗爛以水和調塗之

又方

出聖惠方

治癰腫

用天靈蓋一枚惟陳者佳炙令微黑為細末以蜜調如麪脂塗腫上亦令內消

治已覺有膿未作頭方

出聖惠方

用木香以醋磨塗之乾即再塗不經數遍當便作頭

治癰初發熱毒腫痛方

出聖惠方

用蔓青子一升為細末以醋和如膏封貼腫上乾再

易

治癰腫發背貼熯方

出聖惠方

用菖蒲不限多少濕者搗爛捏作餅子約瘡大小貼之乾則易之如冬月無濕者即取乾者為末用驢乳和搗為餅子用之如不住瘡上以帛縛之

又方

出聖惠方

用搗百合根傳之

治癰膿不出方

出聖惠方

用柳根細切封之以布掩燥復易之

治癰初結腫及發背方

用馬齒莧一斤搗令爛置於銅滓鑊中安於新汲水上候馬齒冷即敷腫上熱即易之當時其腫自消

治癰腫未有頭必穴方

出聖惠方

用搗水芹傳之

又方

出聖惠方

用搗水薺草傳之

又方

出聖惠方

用搗夏枯草傳之

又方

出聖惠方

用搗積雪草傳之

又方

出聖惠方

用搗酸漿葉傳之

又方

出聖
惠方

用搗蒼耳傳之

又方

出聖
惠方

用搗蓼藍傳之

又方

出聖
惠方

用搗景天草一名護火草傳之

治癰腫發背貼熯

用搗苧麻根傳之

諸疽

附論

夫疽者五臟不調所生也五臟主裏氣行經絡而況若
喜怒不測飲食不節陰陽不和則五臟不調榮衛虛者
腠理則開寒客經絡之間經絡為寒所折則榮衛稽留
於脉榮者血也衛者氣也榮血得寒則澀而不行衛氣
從之與寒相搏亦壅遏不通氣者陽也陽氣蘊積則生
於熱寒熱不散故積聚成疽臟氣沉行主裏故疽腫深
厚其上皮強如牛領之皮久則寒勝熱熱氣內盛蘊結

傷肉也血肉腐壞化而為膿乃至傷骨爛筋不可治

初發疽時一粒如麻豆大身體便發熱生疽處肉赤熱腫大而高多生疼痛破後肉色紅紫此為外發雖大若盆盞如用藥有理百人可百活如初發疽時不拘大小身體無熱自覺倦怠生疽處亦不熱數日之間漸漸開大不腫不高不疼不痛低陷而壞爛破後肉色紫黑此為內發有此証者未發見之先臟腑已潰爛百人百不救雖有良藥亦付之無可柰何黃帝問曰有疽死者

奈何岐伯曰身有五部伏菟一腓二背一云膊三五臟之腧四項五五部有疽死也 有緩疽者初結腫形似癰回回無頭尾其色不異但痛有根核又與皮相親著外耳一名肉癰其有大者如拳小者如桃李狀積日不消喜變紫色黯黑久即皮肉俱爛如牛領瘡狀遍體通青黯色而不作頭穿潰出膿初作服五香連翹湯鑱去血以小豆薄塗之其間數針鑱去血又薄塗之取消也若不消色不變青黯者以鍊石薄之若失時不得療已潰

者猶服五香連翹湯及漏蘆湯下之隨熱多少投方也
外以升麻湯搗洗之傳升麻膏若生臭惡者可以單行
一物白藺茹散傳之青肉去盡便停也好肉既生但傳
升麻膏若不生肉單服一物黃耆散也若傳白藺茹散
積日青惡肉不盡者可以漆頭赤皮藺茹取半錢上和
三大錢上白藺茹散中合和傳之惡肉去盡還以純用
白藺茹散也視好肉欲生可傳黃耆散也黃耆散方白
藺茹散方漆頭藺茹散方並一味單行隨多少搗篩為

散 治疽之法灼艾之功勝於用藥緣熱毒中隔上下
不通必得毒氣發泄然後解散古人立論譬諸盜入主
人家必開其門戶逐之使去萬一門戶閉塞無從而
出傷主而後已人不幸而有此疾適處貧困適居僻邑
村鄉難得藥材則灼艾尤為利便灼艾之功須初發一
日之內尖頭如麻豆大時便好措手其法用大獨頭蒜
薄切如小錢厚亦如大錢貼於疽頂尖上以艾炷安蒜
上灸之三壯一易痛者灸至不痛不痛者以痛為度大

槩以百壯為準用大蒜取其毒有力多用艾炷取其火力通透如法灸之瘡一發膿潰繼以神異膏貼之即日而安一能使瘡不開大二肉不壞三口易合一舉而三得之然人未知之而多遲疑未決至二日之後疽大如指毒氣開散病者不能堪火不可灼艾矣可不預知之乎但頭上見疽或頂以上見疽決不可用此法灸灸則反增其疾也 疽疾既成先服取毒之藥只用麥飯石膏塗貼五七日之後病漸減退合服川烏丸二烏丸驅

餘毒活氣血生肌肉排宿膿去風邪既破之後合服內
補十宣散多服為妙 大凡疽口緊小而硬者蓋為風
毒所勝合用蚣蝎散糝於神異膏上止於近瘡處參一
小錢大不必遍地糝藥 疽疾既安之後或未安之際
口中乾燥舌上堅硬如鷄內金者非渴之所能比非水
之所能潤此乃亦是腎家枯渴而搬運不上致令心火
上炎故也此證最惡非惟有疽疾之人見此可慮每見
尋常不問男女無疾之人見之亦日危矣諸家方論未

嘗載此古人云玉華池竭七朝亡者此也多見庸醫不究其源各立新說自出已見投之丹藥為鎮墜心火以升腎水病家不曉信而服之禍如反手殊不知腎水既竭更投之以丹遂令腎水愈涸古人云脾惡濕腎惡燥非滋潤之藥不能療之所用加減八味丸正合其意外有桑枝煎及五味子湯皆良藥也 疸疾將安及七八分便當服加料十全大補湯以補氣血每日當與排膿內補十宣散相間服大凡疸疾多因怒氣而得之若有

此疾必多怒但服附子之藥進食寬氣 疽之証甚惡
多有陷下透者服狗寶丸瘡四邊必起用烏龍膏解毒
散訖須要針刀開瘡口其內已潰爛不復知有痛乃納
追毒丹於孔中以速其潰既潰後割去死肌洗以豬蹄
湯敷以生肌散覆以乳香膏若證之善者自然腫起紅
活乃即如前法

方

乳香圓

出危氏方

治發背及一切疽瘡潰爛痛不可忍者

當歸 川芎 交趾桂 真萊豆粉 川香芷 各五

錢 羌活 獨活 五靈脂 乳香 別研 沒藥 別研 各三錢

白膠香 五錢

右為末煉蜜為丸如彈子大每服一九用薄荷湯嚼
下手足損痛不能起者加大草烏一味用木瓜鹽湯
細嚼下

漏蘆湯 出鮑氏方

治疽作後二日服此退毒下膿可與五

香連翹湯相間連日服之

生黃耆

去蘆頭

連翹

沉香

漏蘆

有白茸者各一兩

生粉

草

半兩

大黃

微炒一兩

右為細末每服二錢煎薑棗湯調下

四虎散

治癰疽腫硬厚如牛皮按之痛

天南星

草烏頭

半夏

生狼毒各等分

右為細末醋蜜調傳留頭出毒氣

治疽潰後

出千金方

以鹽湯洗拭了燒皂莢灰粉上良一方皂角去皮子

治癰疽潰後

又方

出千金方

用梁上塵和車軋中脂傅之

又方

出千金方

用生麻油滓綿裹布瘡上蟲出

又方

出千金方

用沸水湯灌瘡中三四遍

湯一作錫

雲臺熨散

出千金方

治疽似癰而小有異膿如小豆汁今



日去明日滿者

用雲臺熟搗濕布袋盛之埋熟灰中更互熨之不過再三度安瘥冬月乾者一方將甘草湯洗瘡令淨乾以黃栢末塗傅熨了即用以瘥為度

又方

出千金方

用皂莢煎湯洗瘡拭乾以藥皮為末傅之勿令作痂治疽瘡并治軟癰

用多年螺殼燒灰麻油調傅

治疽初作方

出肘後方

用赤小豆為末醋調傳之

大薊散

出濟生方

治飲啖辛熱熱邪傷肺嘔吐出血名曰

肺疽

大薊根 犀角 升麻 桑白皮 蒲黃炒 杏仁

去皮尖

桔根

炒各一兩

甘草

炙半兩

右每服四錢以水一盞半薑三片煎七分去滓食後

服

三灰散

出三回方

治肺疽血病者因飲啖辛熱熱燥傷肺

血得熱則溢因作嘔吐出血一合或半升許名肺疽傷於腑則屬胃傷於臟則屬肺右以此不可究

紅棗

和核燒存性

百藥煎

燒存性各等分

右為末每服二錢蜜調成膏軟柿和嚼自效或米湯

下亦可

治疽潰後

出千金方

用牛耳中垢傅之良

疽發人貼雲母膏痛如刀割不可不審不可不知也亦
不得用生肌藥只貼膏藥自然斂合如醫治後時為
庸醫藥貼或刀割傷風重者兼以五香連翹湯

木香 麝香 乳香 沉香 藿香 連翹

右等分為細末每服二錢水一盞煎至七分放溫服
瘡四邊以金箔先用津液次點之也

五香連翹湯

出仁
存方

治疽作二日後宜與此湯並漏蘆

湯相兼連日服之

木香

沉香

丁香

去核並不見火各半兩

連翹

射干

升麻

黃耆

生剉

木通

乳香

桑寄生

獨活

各三

分麝香一錢

右為麝末每服三錢水二盞煎至一盞去滓取清汁為度或下惡物未生肉以前服不妨以析毒熱之氣氣盛用大黃竹瀝芒硝恐用藥之後不能斟酌量是故不載知者當自相度用之

治久疽瘡無不瘥方

出本草

以伊洛水中石螬形段不同其黃傳之

治黑疽多死宜急治之

用王瓜根一斤搗絞取汁六合頻服當有黃水隨小

便出更服之瘥

王瓜根亦名土瓜根

石疽

附論

夫石疽與石癰之證同此石癰為深以寒客經絡氣血結聚而不得散隱於皮膚之內重按如石故謂之石疽癰疽皆熱氣所作今寒氣為梗故凝結不化其毒內著

結硬如石治宜溫其經絡使熱氣得通其毒外泄故能腐熟而發散化膿血而出也

方

沉香散

出聖惠方

治石疽腫毒結硬口乾煩熱四肢拘急

不得卧

沉香

防風

去

木香

各三分

地骨皮

麥門冬

去心焙

當歸

切焙

升麻

玄參

枳殼

去瓤麩炒

羚羊角屑

獨

活

去蘆頭

甘草

生剉

赤芍藥

各一兩

大黃

剉炒二兩

右麤搗篩每服四錢水一盞半煎取七分去滓不拘

時溫服

占斯散

出聖惠方

治石疽結堅若壞或已成疽者

木占斯

厚朴

去麤皮
姜汁炒

生乾地黄

焙

桔萸

乾者
去皮

敗

醬

防風

去

桔梗

炒

人參

細辛

去苗葉
各一兩

桂

去

半

兩

右為散每服二錢食前溫酒送下

用搗殼子傅之亦治金瘡

地黃煎

出聖濟總錄

治石疽堅硬不消

用生地黃淨洗三斤剉碎細研以布絞去汁入銅器內
盛重湯上煮柳篋攪勻如糖以瓷合盛每日空心取
一丸如彈子大溫酒調下日午晚間服瘥

附骨疽

附論

夫附骨疽者以其無故附骨成膿故名附骨疽喜著大
節解中丈夫產婦喜著陞中小兒亦著脊背大人急著
者先覺痛不可動搖按之應骨痛經日便覺皮肉漸急

洪腫如肥狀是也小兒纔手近便六腑呼即肢節有痛
後也大人綏著者先覺肌烘烘然經日便覺痛痺不隨
小兒四肢不能動搖亦如不隨狀看肢節解中若有崩
烘烘處不知是附骨疽令遍身盛腫至不潰體皆有青
黯大人亦有不別呼為賊風風腫不知是疽也凡人身
體患熱當風取涼風入骨解中風熱相搏便成附骨疽
其候嗜眠沉重忽忽耳鳴又秋夏露卧為冷所折風熱
伏結而作此疾急者熱多風少緩者熱少風多小兒未

知取風冷何故而有此疾由其血盛肌嫩為風析之即使凝結故也凡初得附骨疽即瀉服漏蘆湯下之傅小豆散得消可服五香連翹湯凡賊風其人體卒無熱中暴風冷即骨解深痛不廢轉動按之應骨痛久即結痛或結癰瘰其附骨疽久即腫而結膿以此為異宜若治附骨為賊風則增益病深膿多若治賊風作附骨即加風冷遂成癰瘰偏枯攣曲之疾也療之效皆在善始耳若候附骨與賊風為異者附骨之始未腫但痛而已其

賊風但痛不熱附骨則其上壯熱四體乍寒乍熱小便赤大便澀而無汗若得下却熱開發腠理便得消也縱不消盡亦得浮淺近外凡賊風但夜痛骨不可按仰而不得回轉痛處不壯熱亦不乍寒乍熱多覺身體索索然冷欲得熱熨痛處即小寬時復有汗出此為賊風證也宜針灸熨燂諸服治風藥即愈 有久癰餘瘡敗為深疽者在膈脛間喜生瘡中水惡露寒凍不瘡經年成骨疽亦名胛瘡深爛青黑四邊堅強中央膿血汁出百

藥不瘥汁潰好肉處皆虛腫亦有碎骨出者可溫赤龍皮湯漬夏月日日洗冬月四日一洗青肉多傅白蘭茹散食去惡肉可三日傅之止後長傅家猪屎散得瘥止取猪屎燒灰作末如粉致瘡中令滿白汁出吮去隨更傅之瘥止若更青肉復着白蘭茹散如前法家猪屎散取平復凡骨疽百療不瘥者可瘡上以次灸之三日三夜便瘥如瘡不瘥瘥而復發骨從瘡中出者名為骨疽先取烏鷄一隻去肉取骨熬焦如炭取三家牛槁木刮

取屑三家甑算各一兩皆燒成灰合導瘡中碎骨當出
數片瘥 附骨疽與白虎飛尸瘕節風皆相類瘕節風
則走注不定白虎飛尸痛淺按之則便止附骨疽痛深
按之無益一說白虎飛尸亦能作膿著骨而生及其腐
潰碎骨出盡方愈如是則附骨疽與白虎飛尸是一病
但深淺不同耳白虎飛尸又俗名風煞然痛附骨疽少
有骨出者宜拔毒熱不可一向泥於五香連翹漏蘆之
屬當先溫腎如靈寶膏及神藥唯在針烙淺深刺拔其毒

根則易愈不爾則順脉流走遍體洪腫卒致不救 附
骨疽治之宜去熱毒又當溫腎未可專用涼劑若在針
烙其病務詳淺深刺拔其毒根則易愈不爾則順脉流
走遍體洪腫卒致不救至於所患之時猶或當於外證
未潰以前發渴乃臟腑焦燥痢下乃引飲無度已潰而
渴則膿血去多津液中乾或腹腸胃暴虛遂成下痢體
虛受寒則噉聲不息氣逆挾熱則痰盛於胃熱毒不泄
為二便秘塞毒氣迫心為嘔噦驚悸陰陽交爭血氣不

和寒熱併作臟腑傷敗便血逆出毒氣攻外煩燥異常
惟須大方料藥同治可也

方

牛黃散

出聖惠方

治附骨疽及一切惡瘡宜此藥

牛黃

研細

麝香

研細

木香

丁香

懷香子

乳香

研細

硃砂

研細

雄黃

研細

黃丹

黃蘗

剉

苦參

剉

膩粉

各一分

研細

右為細散入研了藥同研令勻剪單紙條子看瘡眼
子大小每一條子紙用藥末一字已下撚藥末在紙

條子內維於瘡中不計近遠如藥無力紙條子自退
即依前更用藥末為紙條子更維候紙維漸短直至
好瘡為度若患惡瘡不計在甚處看瘡眼子大小皆
用維子不計箇數以瘡為度

連翹湯

出聖濟
總錄

治附骨疽

連翹

射干

升麻

防已

黃芩

去黑心

大黃

剉炒

甘草

炙

芍藥

杏仁

湯浸去皮尖
雙仁各一兩

柴胡

去苗
三兩

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎至七分入芒硝一錢

去滓空心服

漏蘆湯

出聖濟總錄

治附骨疽

漏蘆

去蘆頭

升麻

連翹

麻黃

去根節各一兩

大黃

剉炒一兩

半防已

木香

白欬

沉香

各二分

右麤搗篩每服五錢水一盞半煎入竹葉七片至八分再入芒硝一錢攪勻去滓空心溫服取利三二行

未利再服

赤朮散

出危氏方

治附骨疽膿出淋瀝久而不瘥已破未

破

赤朮

一斤米泔浸三宿取出洗淨晒乾再以大麻

皂根煮黑油出
洗淨焙乾秤

破故布

炒

川棟

剉炒

茯苓

舶上茴

香

炒

杜茴香

白芷

桃仁

去皮尖炒
各半斤

右為末煉蜜丸如桐子大每服五十丸酒鹽溫湯送

下一方老人加黑附子

天靈蓋散

出聖
惠方

治附骨疽腫痛有膿久而不瘥

天靈蓋

燒一兩
灰

狗骨頭

燒半兩
灰

麝香

一錢
細研

黃連

一分
去鬚

黃

栢分一白礬半兩燒令汁盡

右為細散入麝香令勻每用先煎甘草湯洗拭乾用

生油調塗之

天南星散出聖濟總錄

治附骨疽

天南星炮附子炮裂去皮臍黃蘗去麁皮各半兩鉛丹研一分麝

香研半分半

右附子麝香鉛丹外搗篩為末入二味和勻乾傅瘡

上日三

騏驎竭散

出聖濟總錄

治附骨疽塗傳

騏驎竭

檳榔

剉

黃連

去

馬腸根

各一兩

右為散先以油炒葱豉入膩粉半兩和搗捻作餅子二片用鹽漿水洗瘡用餅搗瘡上以生帛縛定三日後再用鹽湯洗即塗傳散子日三

應痛丸

出瘡科精要

治走注痛疼疑是附骨疽者

蒼朮

去

當歸

草烏頭

炮

黑牽牛

各一兩

右為細末用醋糊為丸如小豆大每服三十丸空心

醋湯下

亂髮湯

出聖濟
總錄

治附骨洗方

亂髮灰

半兩

杏

桂碎二
十一枚

甘草

剉五
寸

鹽花

半兩

右以漿水五升煎至二升濾去滓通手洗疽上有膿
血洗取淨後以絹縛定每日三兩遍洗妙

天靈蓋散

出聖濟
總錄

治附骨疽瘡及陰瘡久不瘥塗傳

天靈蓋

酥炙
一兩

狗骨

燒灰一
兩半

白礬

燒灰一
兩半

麝香

研一
錢半

右為散乾傳瘡口日三次

皂莢膏

出聖惠方

治附骨疽腫

皂莢

十挺肥實無
艸者槌碎

吳茱萸

二兩末

杏仁

二兩湯泡去
皮尖研如泥

水銀

一兩以去棗穰
同研令星盡

右件藥以頭醋三升煎皂莢取一升五合濾去滓下
茱萸杏仁以文火煎成膏次下水銀和勻置不津器
中於故帛上塗貼患處

治附骨疽多年不瘥

多年油脚

一兩

麝香

一錢細研

豬骨髓

一兩

右都研為膏塗於瘡上

龍骨粉膏

名蟾蜍膏
出千金方

治久瘡癰敗壞成骨疽或骨從

瘡孔出以龍骨粉瘡四面厚三分以膏著瘡中日二
易蟲出於髮盡愈膏方如左

大蝦蟇

一枚自
死者亂髮

一塊鷄
子大

猪脂一斤

右取二味內脂中煎畧消盡下待冷更內鹽一合攪
勻先前用之一方先以桑白皮烏豆煎湯淋洗拭乾
後用藥貼

敗醬湯

出聖濟總錄

治附骨疽

敗醬

二兩

大黃

剉炒

桃仁

二兩

右麤搗篩每服五錢先取皂莢刺一兩剉碎以水二盞煎至一盞半濾出下藥及朴硝一錢同煎至八分去滓空心溫服

麝香散

出聖濟總錄

治附骨疽久不瘥

麝香

研一分

騏驎竭

蜜陀僧

煨各一兩

右為散先用鹽湯洗瘡拭乾取活鱖魚一條剉碎研

搗瘡上一宿明旦揭看有蟲即去再拭乾塗傅散子日

三

烏鷄散

出聖惠方

治附骨疽久不瘥骨從瘡口出

烏雌鷄骨

燒灰

牛膝木

刮燒灰三家者

炊單

燒灰三家者各一兩

右合和研細傅瘡上日三五度碎骨出瘥

又方

出聖濟總錄

治附骨疽積年發膿骨出不瘥

黃丹

細研膩粉

研各三錢

鷄子

五枚煮熟去白用黃

右將鷄子黃於鈹子內以慢火炒令黑候自然為膏

於盞內入黃丹膩粉和勻用時先以米泔煎湯洗患處拭乾用藥傅之

治附骨疽及魚眼瘡

出聖惠方

亂髮灰

一兩

膩粉

二錢

杏仁

五十枚

燒令灰

右同研細入油二合蠟半兩煎攪令勻入瓷合盛淨

洗貼之效

小豆散

出聖濟總錄

治附骨疽內消

赤小豆

一合 糯米

炒黑五合

右為散水調如糊攤故帛上塗貼乾即易之

治附骨疽積年發膿骨出不瘥

出聖惠方

白礬

枯別研

新枸杞子

自然汁

右先將杞子汁慢火熬成煎後入白礬團合堅實陰乾搗羅為末每用時以甘草水洗之拭乾先唾塗瘡上次用藥末固匝傅之

治附骨疽及冷瘻一切惡瘡等

一名蜚螂丸出聖惠方

蜚螂

燒灰一兩

巴豆

半兩去皮心研紙裏壓去油

右為細散用傅瘡上旦換之多時患者不過三上效
一方用津調入孔中

治瘡久不瘥瘥而復發骨從孔中出者名為骨疽

出千金方

用蜜陀僧為末以猪脊髓調傅之兼治痔漏不愈

秦芄散

出聖濟總錄

治附骨疽久不瘥或瘥經年再發

用秦芄去苗土搗羅為散塗傅瘡上以帛縛定日二

三次

牛膠散

出聖濟總錄

治附骨疽積年發膿骨出不瘥

用水牛皮膠炙焦細研為散塗傳瘡上用生鯽魚破
開外面貼定時看有小蟲出更以鹽湯洗傳上藥再
加魚貼蟲行盡更傳藥

黑鯽膏

出千金方

治附骨疽未破或膿出不盡并久疽不

瘥用黑色鯽魚一箇去腸入白鹽令腹滿用綿縛定
以水盪銅石器中煮水盡乾焦為末用猪油調傳已
破者乾糝小疼無怪

療髓疽日鋌深嗜卧方

用牡礪澤瀉二味主之

治附骨疽及魚眼瘡

出聖惠方

以蜚螬七枚和大麥麵爛搗封之

又方

出聖惠方

用蜚螬乾者為末以烏鷄脂塗瘡口上以散傅之

又方

出聖惠方

用猪骨頭燒煙薰之

治瘡久不瘥瘥而復發骨從孔中出名為骨疽

穿地作口外小裏大深三尺取乾鷄屎二升以艾及
荊葉搗碎和鷄屎令可然火坑中燒之令煙出內疽
於坑中薰之以衣覆坑口勿泄氣半日當有蟲出

治附骨疽

出千金方

用檨皮燒末飲服方寸匕檨葉亦可

又方

出千金方

用新剥鼠皮如錢孔大貼腫上即膿出已潰者取猪
脊上脂貼之

抵聖散

王氏傳
濟方

治骨疽瘡及冷漏久不合者

的乳香

膩粉

白礬

各等分
燒存性

右為細末每遇患時先以鹽水洗之以津唾調瘡上

必效

治附骨疽蝕等瘡

本草

以螻蛄燒為末和臘月猪脂傅之

治骨癰病及瘡癰

本草

以牛膝為末酒服方寸匕日三

癰疽 附論

夫癰疽為病毒發疾轉不旋踵而害人故其字從票音同於飄風之飄治之不可稍緩也古人謂人受惡風入於肌脉變成斯病蓋厲氣蘊伏初未知覺毒鬱既發則若火熾烈不可嚮邇是以其伏隱少而深實黯黑而不明其痛復應於心毒氣已深故其證如此 癰疽者肉中或生點子如豆粒小者如黍粟極者如梅李或赤或黑或青或白其狀不定有根不浮腫痛傷之應心根深

至肌經久便四面悉腫疱黯熟紫黑色能壞爛筋骨若
毒散遂脉入臟殺人南人名為榻著毒厚肉處即割去
之亦燒鐵烙之令焦如炭或灸百壯或飲葵根汁或飲
藍根汁若犀角汁及升麻汁竹瀝黃龍湯等諸單方治
專去其熱取瘥其病喜著十指故與伐指相似人不識
之呼作伐指不急治之亦遂脉上入臟殺人南方人得
之皆斬其指初指頭先作黯疱後始腫赤黑黯慘痛入
心是也 復有惡肉者身上忽有肉如赤豆粒突出便

長推出如牛馬乳上如鷄冠狀不治自長出不止亦不
痛癢此由春冬之時受惡風入肌脉中變成此疾治之
宜服漏蘆湯外燒鐵烙之急為之令焦盡即以升麻膏
傅上積日乃瘥 其發赤黑青白色變不常或臂或臀
或口齒或肚臍發無定處大槩多見於手指之間根深
入肌走臂逆腫毒血流注貫串筋脉爛肉見骨出血及
多令人串痛狂言痛入於心即死毒氣出於外腎者亦
死此瘡最慮引風治法宣毒行血尤當於心腎焉蓋心

為萬病之門敗血鬱滯煩燥悶皆毒氣攻心之故也
心家為毒所攻若於小便利之又恐外腎虛怯易至傷
風勢得宣毒於大便如瓜蒌酒之入沒藥五靈脂皂莢
刺帶生灰是也是雖大便引導毒氣然清心行血去風
邪之劑如何為廢心清血行風邪解散庶乎有瘳矣經
云在指則截在肉則割蓋慮毒氣隨風走肌隨脉入腹
倏忽害人此疾初因感受惡風入於脉理或傷寒瘴瘧
之後毒變所生凡癰疽發開一寸則一寸引風非必風

入於中虛處自引風也惟風邪襲虛則肉爛透骨惡血

橫流

天南星生半夏白芷稍散能去風可以頻傳其瘡療兼推廣疽癰發度行之

癰疽一

名蛇瘡南地多有蛇毒吐毒於蠻煙瘴雨之鄉人有伏

水土風氣感而觸之者數月已還未有不發為蛇瘡也

惟赤蜈蚣伏蛇最為上藥雄黃白芷次之諸蛇藥亦可

以制其毒矣

雄黃有毒爛肌但宜和蛇藥用

胷中痛少氣急入閤中

以手掩左眼竟視右眼見光者胷中結癰也若不見光
癰疽內發若吐膿血此不療之疾宜以灰掩膿血上不

爾著傍人也又齒間臭熱血出是瘰癧也七日死療所
不瘥宜以灰掩地血

方

麝香摩膏

出聖惠方

治瘰癧散毒氣

麝香

半兩
細研

莽草

二兩

川升麻

三兩

寒水石

黃芩

各二兩

羚羊角屑

射干

各三兩

丹砂

細研

芎藭

各二兩

川大黃

三兩 雞舌香

二兩

生地黄

二升

羊脂

一斤

木香

二兩

右藥細剉以猪脂二斤入地黄汁羊脂諸藥煎候黃

芩黑色綿濾去滓入麝香丹砂末攪令勻收瓷合中
頻頻以摩瘡上

丹砂膏

出聖
患方

治癰疽

丹砂

研細

犀角屑

射干

大黃

剉炒

芫薺

黃芩

去黑

心升麻

前胡

去蘆
頭

沉香

木香

各一兩

猪脂

二斤半

生地黃

二兩

麝香

半分
研

右除丹砂麝香猪脂外剉碎以醋半升和勻浸一宿
先熬脂令沸次下諸藥煎候地黃赤黑色以綿絞去

滓入丹砂麝香末以柳筴攪勻瓷合盛傳患處日三
五上又取二匙以溫酒調空心日午服一方溫水調
下半匙

犀角丸

出聖濟
總錄

治癰疽初覺宜速取利

犀角屑

一兩半

大黃

剉炒黃芩
去黑心

防風

人參

當歸

切焙

黃耆

梔子仁

黃連

去鬚

乾鹽

甘草

炙剉

各半

巴豆

十二粒
去皮心

右除巴豆外搗羅為末研入巴豆令勻煉蜜丸如桐

子大每日空心米飲下三丸如未利加五七丸以利為度

猪蹄湯

出千金方

治癰疽諸疽十指頭焮赤痛癢

白芷

大黃

芎藭

黃芩

黃連

甘草

各一兩

細辛

藁本

當歸

藜蘆

莽草

各一兩

右㕮咀以水二斗先煮猪蹄一具取一斗煮藥取五升浸瘡即瘥一方無藜蘆

枳實湯

出千金方

治癰疽

射干 甘草 枳實 升麻 乾地黄 黃芩 各二

兩麝香 分二 前胡 分三 犀角 分六 大黃 分十

右呖咀以水九升煮取三升下大黃沸去滓內麝香
分三服瘥一方無大黃倍加黃芩麻黃白薇枳實升
麻松葉忌海藻

漏蘆湯 治瘰疽

漏蘆 去蘆頭 白欬 黃芩 去黑心 麻黃 去根節 白薇 枳

實 炒 升麻 芍藥 甘草 炙 大黃 剉炒各一兩

右麋搗篩每服五錢水二盞煎至一盞去滓空心溫服日三服一方無白薇

射干散 治療疽皮肉中忽生點子如麻豆大或如桃李腫痛不可忍

射干 升麻

枳實

麋炒微黃

川大黃

各一兩剉碎微炒

麝香

一分細研 前胡 一兩去蘆頭

犀角屑

三分 羚羊角屑

三分 甘草

一兩

生剉

右為麋散入麝香令勻每服四錢水一中盞煎至六

分不拘時溫服

款冬花膏 治癰疽手足累累如米起白色刮之汁出

愈後復發

款冬花

半兩

黃耆

剉一兩半

升麻

一兩

赤小豆

附子

炮去皮臍

苦參

各一兩一分

右為散每服一錢空心溫酒調服日再加至二錢

消毒散 治癰疽熾甚

藜蘆 大黃

剉炒

黃栢

黃連

當歸

甘草

各一兩

右呔咀如麻豆以水一斗煮至五升去滓浸淋瘡處
即瘥

薄搗湯

一名甘草湯

主癰疽浸淫欲作未成如桃李核或

如鷄子赤炊方

甘草

炙

黃芩

大黃

黃連

當歸

芒硝

各一兩

右切以水一斗煮取三升絞去滓置鐺中下芒硝一沸
攪之貼布帛中以搗上數百遍

青木香散 治癰疽着手足肩背累累如米起色白刮

之汁出瘰後復發

青木香

滑石

龍骨

各三兩

糊粉

一兩 米粉

一升

右為末稍以糝病上日三次

黃連散 治瘰疽浸淫多汁日漸大

黃連

二兩

糊粉

甘草

藺茹

各二分

右治下節以糝瘡上日三四度

肘後名報粉散

瘰方

生髮

燒存性

英刺

燒帶生各二分

赤蜈蚣

半燒

厚黃栢

各一分

右為細末用雄豬膽汁調傳

又方

鷄內金

生髮

各燒存性
和

天南星

半夏

各等分
生

右為細末乾摻之

洗湯療疽方

荊芥穗

白芷

漢椒

去目

連根葱白

各等分

右用井水煎入鹽候溫自手背上盪下日三次療疽毒氣走背腫所至處緊繫之

又方 治癰疽著手足肩臂累累如米起白色刮之汁出瘥後復發

竈屋塵 釜下土

各一升

右合研令勻以水一斗煮三沸取汁洗日三四度

魚髮膏 治如前

鯽魚

長三寸者 亂髮

鷄子大

猪脂

一斤

右煎為膏傳

又方 治癰疽

皂莢刺

燒帶生

白芨

少許

右為細末摻諸瘡上

黃連散 治卒得癰疽一名爛瘡

黃連

去鬚搗末

胡粉

各一兩

右藥相和研令勻細以油調塗之此瘡初起作癰疔疼痛焮赤宜用生鐵燒赤二七遍入水中日二三度以洗之

治癰疽無頭腦出在指甲上

獨頭蒜

一兩

杏仁

一兩

去皮尖湯浸

右藥爛研相和炒令熱傅瘡上以軟帛繫之數易

治癰疽著手肩背累累如米起色白刮之汁出瘡後復

發

出千金方

用虎屎白者以馬屎和暴乾燒為灰糝之良一方單用

馬屎傅之亦可

又方

出千金方

用麻子熬作末摩上良

又方

出千金方

用酒和麴傳之

又方

出千金方

以猪胆傳之良

又方

出千金方

剥去瘡痂溫醋泔清洗之以胡燕窠和百日男兒尿
如膏傳之用煮芸臺菜取汁一升服之并食乾芸臺
數頓少與鹽醬冬月研子水煎服之

又方

出千金方

用枸杞子根并葵根煮汁如飴糖隨意服之

又方

出千金方

用臘月糖晝夜連浸數日乃愈

療方

出千金方

用生髮燒灰存性為末米湯調服兼傳漏瘡一方治

發背宜服之

治卒得癰疽一名爛瘡

出聖惠方

用燒牛糞作灰細研用油調傳之

治癰疽着手足累累如米豆刮之汁出

出聖惠方

用蔓青子二兩炒熟為細散以猪脂和傳其上一方

無猪脂綿裹傳之

治癰方

出直指方

用燕巢和百雀兒糞研膏傳之

治癰疽徹骨痒者

出本草

以狗屎燒灰傳疽瘡勿令病者知

治時行熱癰瘡

用羊膽以醋和服之良

風疽

附論

夫風疽者本由風濕之氣入於腠理流注血脉凝澀不利攣曲腫起發作瘡疽所以疼痛經久不瘥者是也蓋風勝則動故其疽留止無常得之醉卧出汗當風入膚腠客於經絡與榮衛而相成

方

黃耆丸

出聖濟
總錄

治酒醉汗出風入經絡久成風疽

黃耆

剉

犀角

黃連

去鬚

茯神

去木

當歸

切焙

芍藥

升

麻

黃芩

去黑心
各五分

木通

八分

甘草

生剉
三分

防風

去叉
五分

麝

香

另研
半分

右為末拌勻煉蜜丸如桐子大每服二十九丸空心生

薑湯下食後再服即煎麥門冬湯下

麻黃湯

出聖濟
總錄

治酒醉汗出風入經絡成風疽

麻黃

去根節
三兩

五加皮

一兩半

防風

去叉

獨活

去蘆頭

桂

去麋

皮當歸

切焙

芫薺

乾薑

炮各二兩

附子

生去皮臍一枚

牛膝

二兩

半

杏仁

去皮尖雙仁八十枚

右細剉以水九升先煎麻黃掠去沫入諸藥煎取三

升絞去滓每用一盞溫服併三服溫覆微汗忌風

防風湯

出聖濟總錄

治風毒中人留血脉不散與榮衛相

搏結成風疽身體煩熱昏冒腫痛

防風

去叉

柴胡

去苗

白芷

桔梗

炒

木通

剉

當歸

切焙各一

兩半羌活

去蘆頭

麻黃

去根節煎去沫畧焙

附子

炮去皮臍

甘草

炙剉各一

兩

右咬咀如麻豆每服五錢水一盞半煎至八分去滓
溫服食後臨卧各一如欲出汗空心併兩服後以熱
薑稀粥投蓋覆取汗慎外風

海桐皮浸酒方

出聖濟
總錄

治熱毒風結成疽腫痛行履

不得

海桐皮

剉

五加皮

剉

獨活

去蘆
頭

防風

去
義

乾蝎

炒

杜

仲

去蘆
皮

牛膝

去苗
浸切焙

薏苡仁

炒各
一兩

生乾地黃

焙三
兩

兩

右麤搗篩生絹囊貯以好酒一斗五升浸於瓷瓶中
密封秋夏三日春冬七日開取食煎溫酒合加至四
五合不拘時甚者常令酒氣相續

秦芄丸

出聖濟
總錄

治風毒氣客於經絡成風疽

秦芄

去土

苦參

升麻

黃芩

去黑皮

枳殼

麩炒

防風

去義

惡實

炒各四分

烏蛇

酒浸去皮骨炙

蒺藜子

炒各五分

右為末煉蜜丸如梧桐子大早晚食後以蒺藜子煎
湯下二十九丸

大豆酒方

出聖濟
總錄

治熱毒風腫成疽日夜熱痛

大豆

緊小者
三升

麻子仁

細研
二升

烏蛇

一條去頭尾皮
骨重四兩槌碎

右相和令勻就甑內蒸令熟去甑底湯將好酒一斗五升就甑中淋候酒熱又淋凡七八遍入瓷甑內密封候冷量性飲常帶酒氣佳

大豆汁塗方

出千
金方

治風疽搔之黃水出

凡脚脰及曲
胫中痒搔則

黃汁

出是

大豆一馬尿

二升一
作尿

白蜜

半
斤

右拌令勻用青竹筒盛實築架在炭火上當中慢燒
將瓷碗兩頭盛服取汁先用泔清入鹽少許和溫洗
瘡上拭乾後以藥汁塗日三五度一方無白蜜入糠
馬屎

又方

出千金方

用嚼胡麻傳以綿裹之至旦易

緩疽

附論

夫緩疽者以寒氣客於經絡榮衛凝澀甚寒氣盛則腫

痛深伏其狀無頭尾大如常人之拳小如桃與皮肉相附著其腫與肉色相似亦不甚赤積日不潰久乃變紫黯色肉俱爛如牛領瘡以其初勢緩慢故名緩疽以其腫色與肉色相似故又名肉色疽

方

黃耆散

出聖惠方

治緩疽及諸癰腫膿血結聚皮肉堅厚日久不潰疼痛

黃耆 沉香 薰陸香

連翹

各二分

羚羊角屑

一兩

雞舌香

漏蘆

去蘆

黃芩

去黑心

梔子仁

甘草

生

防風

去

桔萎根

各半

兩

右麝搗篩每服五錢水

一盞

煎至六分

去滓

不拘時溫服

一方有薄荷已三分

排膿散

出聖惠方

治緩疽日久穿潰出膿水不盡

貝齒

一兩

黃耆

剉

當歸

剉微炒

生地黄

焙

赤芍藥

黃連

去鬚

升麻

桂

去麋皮

白欬

犀角屑

各三分

甘草

半兩

麝香

一分

細研

右為散拌勻再羅過每服二錢不拘時溫酒調下

生地黄乾散

出聖惠方

治緩疽風熱侵腫不住肉欲成膿四肢煩熱

生乾地黄

一兩

川大黃

剉碎微炒

人參

去蘆頭

黃芩

各一兩

當歸

半兩

遠志

一兩

麥門冬

去心

一兩半

川升麻

兩

赤芍藥

一兩半

黃耆

剉

赤茯苓

一兩

羚羊角屑

一兩

右為麤散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分不

拘時去滓溫服

犀角散

出聖惠方

治緩疽風熱毒氣結聚腫痛寒熱不止

犀角

漏蘆

各一兩

川大黃

一兩半剉碎微炒

川升麻

兩半梔

子仁

一兩

甘草

三分生剉

木通

麥門冬

去心

枳殼

麩炒微黃去瓢

知母

玄參

各一兩

右為麁散每服四錢水一中盞煎六分去滓入地黃

汁半合更煎三兩沸不拘時溫服

飛黃散

出聖惠方

治緩疽惡瘡蝕惡肉

丹砂 雄黃 磁石 曾青 白石英 礬石

石膏 鍾乳粉 雌黃 各二兩 雲母粉 三兩

右各細研為散用瓦盆一口丹砂安南雌黃安中磁石向北曾青在東白石英在西礬石當上石膏次更下鍾乳雄黃雲母覆蓋更用一盆覆蓋定以泥封厚一寸於竈底以陳葦燒一日取出看取飛上者研細傳瘡上日二遍

莽草散

出聖惠方

治緩疽初結微腫疼痛

莽草 鹿角屑 白欽 白芨 半夏 天南星

附子

去皮臍 各一兩 蛇蛻皮 一條

皂莢

兩挺 黑皮及子

右為散用醋麪薄糊調為膏塗貼腫處乾即再上腫散為度

黃栢膏

出聖惠方

治緩疽

黃蘗

剉

桐葉

切各一兩半

龍骨

一兩

黃連

一兩半 去鬚

敗龜

大拳

燒灰 細研

麝香

一分 細研

右藥以猪脂二斤煎前四味十餘沸布濾去滓拭鎗

令淨却入鐺中再煎入後五味攪令勻收於不津器
中每用以故帛上勻攤貼之

木香散

出聖惠方

治風毒氣留滯榮衛不通欲結為緩疽

燭之令內消貼

木香

半兩

桂心

二兩

白欬

半兩

赤小豆

一合

莽草

半兩

附子

一兩去皮臍

半夏

半兩

洋桃根

二兩

右為細散以酸漿水旋調稀稠得所塗故軟布及生
布絹上貼之乾即易之以腫消為度

藺茹膏

出聖惠方

治緩疽腫痛內堅厚如牛領皮下針烙

乾即用生薑維緣疽氣沉澀乾薑味辛辛能散氣消
痛又善引膿化惡肉可以綿裹薑末深縫瘡中日三
二遍換以腫退為度蝕出瘡中惡肉

藺茹

三分

藜蘆

半兩去蘆頭

珍珠末

硫黃

細研

右為細散都研令勻瘡上如惡肉拔深可以綿裹入
瘡中候惡肉化盡貼生肌膏取瘡為度

芍藥湯

出聖惠方

治緩疽

芍藥 當歸

各一兩

黃耆

剉

生乾地黄

焙

赤茯苓

去黑

皮各半兩

人參

甘草

炙各三分

右麤搗篩每服五錢水一盞半入生薑半分拍碎棗

二枚擘破煎至八分去滓空心溫服晚再如法服之

蛇床散

出聖惠方

治緩疽

蛇床子

一分研

杏仁

湯泡去皮尖雙仁細研入

黃連

去鬚搗末

乳香

細研

各半兩

鹽

一分研

蔓菁根

三兩切爛搗

右以蔓菁根和藥末細研令勻塗傅腫上乾即易之

雄黃散

出聖惠方

治緩疽以飛黃散蝕惡肉盡薰之

雄黃

乾鷄屎白

藜蘆

去蘆頭

丹砂

細研

乾鱖鱉魚

炙焦各一兩

右為散以青布裹之安小土竈內燒薰患處如是薰三日即止後用黃耆散常法傳之一方用蛇銜膏摩之

黃耆散

出聖惠方

治緩疽

用黃耆二兩細剉搗羅為散傳瘡上一方不計時候

以溫水調下二錢匕

治緩疽方

出聖惠方

用蘭茹一兩搗為末不計時候溫酒調下二錢一方用二兩為散傅之

追蝕一切瘡腫

附論

夫癰腫若寒多及毒深外證雖結聚鞞鞭不消疼痛難任未能腐化或已穿穴經久不瘥在外者須以藥蝕在裏者須以藥托令毒氣發泄榮衛流通則癰疽得瘥矣

所以有追引蝕癰之方

方

覆煎散 治諸般癰疽腫毒癰毒

歸稍錢一 歸身錢二

防風稍錢一

風身錢二

蘇木錢半

黃栢錢二 甘草

二錢半

全蝎錢一 陳皮錢一

羌活錢一

人參錢五

黃芩錢一

防已錢五 連翹錢三

藁本錢一

黃耆錢一

桔梗錢二

澤瀉錢五

知母錢五

生地黃錢五

芍藥錢一

右為麤散只作一服煎先用井水浸藥一箇時辰再用長流水一大碗煎七分又用好酒數十滴入藥內

作一服溫飲看病上下食前後

治發背腦疽疔瘡惡腫

發背疔瘡與腦疽麝香沒藥乳當歸膩粉官粉二錢
各等分一對蜈蚣九焙枯粉霜砒信各半字一錢腦
子細羅酥蟾汁振尖如菜子通針深送入瘡疽半熟
半痛過半日管取醫交命再甦

千金漏蘆湯 治腫癰癰無名腫毒皆可服

生大黃 白欬 甘草 赤芍藥 黃芩 白芨

升麻 麻黃 枳殼 山梔子 當歸鬚各等分

右咬咀水一盞半煎七分去滓空心服又治諸毒腫
丁香散 治癰疽發背熱毒攻炊肌肉赤色疼痛欲成
膿令速潰

丁香 赤小豆各半兩 寒水石一兩 洋桃根 硝石研

大黃各一兩 木香 白斂 榆皮剉 防已各三分

右搗羅為散先以雄雀屎七粒乳香一小塊細研以
醋調和塗瘡頭上以醋調藥末如糊攤故帛上貼之

乾則易

龍射破棺散 治一切癰疽發背腫惡

霍香 地丁 瓜蒌 紅藤 甘草 紫草

各一兩

黃耆

五錢 當歸 五錢

右為細末每服二錢水調下

通關散 治一切癰疽無頭腫痛宣通立愈

大黃

一兩 牡蠣 半兩 燒

山梔子

三錢 地龍 二錢

甘草

三錢 炒

右為末每服五錢水一盞煎至六分去滓溫服以利

為度

乳香拔毒散 治一切癰腫瘡癤消毒止痛

黃蘗

去麤皮

黃芩

去肉各二兩

地骨皮

一兩

乳香

另研三錢

沒藥

另研三錢

右為末井水調作膏子攤在紙花上貼於瘡處

追毒丸 治癰疽已潰蝕惡肉

巴豆

去皮心膜十四枚

白丁香

二十一枚

豆豉

二十粒

屍盤蟲

七枚

右同研細滴水丸撚如雀糞大紐瘡內追汁盡即止

搜膿散

出瘡科精要

治年深不瘥惡瘡有膿不能自出

芎藭

二兩

白芷

一兩

白芍藥

三兩

輕粉

二錢

右為細末每用乾摻瘡口深者絀之

搜膿散

出御藥院方

治諸瘡膿汁不絕腐肉未盡

黃耆 白芍藥 香白芷

各等分

右為細末乾摻患處只可少許却用膏藥敷貼日一

換

透肌丸 治癰疽腫未有頭疼痛不可忍

硼砂

研

斑猫

去翅足

烏頭尖

右等分搗研為末醋煮麪糊丸如小豆大捻令匾貼
在瘡上却用膏藥花子蓋透為度如惡物出盡次用
後方合瘡口生肌散

生肌散

白礬

燒令
盡一兩

黃連末

一分
輕粉一分

右同研細不拘多少摻瘡口上候生肉滿膿水盡瘡
口乾即止為效

追膿散 治癰腫癰毒出膿疼痛

濕生蟲

五十枚瓦上燂乾

小麥

五十粒

麝香

研半錢

右搗研為末每用一字絛在瘡內

通關膏

治瘡癰癰疽等無頭者

乳香

輕粉

各等分

右研勻津唾調塗腫處以紙貼之

敗毒丸

治一切癰疽未破

巴豆

去皮心膜三枚

鉛丹

少許

右同研入生麪少許再研勻丸麻子大每以一丸安

瘡口外以膏藥貼之膿即出

括萐酒 治癰癤多日不熟無頭者

括萐一枚甘草三寸

右剉碎用酒一盞水一盞量人虛實入膩粉少許煎三五沸去滓臨卧溫服夜半踈動一行其瘡自消

葱香塗傳方 治腫毒及癰癤不穴

煨葱一枚乳香如棗核大一枚

右爛研塗腫上即潰

治無名腫毒發背腦疽皆可治之

炒黃小粉

五分

炒半夏末

一分將黃下灯草末同炒要研草法陽手送陰手接下盆

石研細

右研細無根水調傳之甚效

治膿潰後瘡不合方

出十金方

用燒鼠皮一枚為末傳瘡孔中

又方

出十金方

熟嚼大豆以傳之

又方

出千金方

炒烏芝蔴令黑熟搗以傅之

又方

出千金方

以牛屎傅之乾即易

又方

出千金方

燒破蒲蓆灰臘月猪脂和納孔中

治腫毒未成頭熱痛方

以蟬蛸不計多少生研細入少麴并醋三兩滴調紙

花子上攤剪一眼子時以水潤覺藥力盡再用候痒
揭去自然膿為效

治癰未有頭使必穴方

取茅錐一枚尖正同具者以水煎十數沸服之立潰
若兩莖即生兩孔或斷折一錐為二亦兩孔

嚙葵子方治癰癰無頭

取葵子一合以津嚙三五枚多嚙即頭出多假令嚙
一粒穿一穴也隨癰癰大小不可過多

雀糞塗傳方 治癰腫速穿潰

以雄雀糞二十一枚用醋研和如糊塗傳腫上膿便
出未穴再塗即破

地黃膏塗貼方 治熱癰腫結熱振熾欲作膿

以生地三斤細切搗汁用麻布絞其汁出於銅器內
慢火煎攪成膏取傳腫處以故帛塗貼之亦得日三
五次易其癰即潰

治癰癰諸腫難穿者

用已出未變全生蜂兒瓦上焙乾研末一分生蝦肉
搗碎二分合和敷患處四邊留中心須臾或穿或散
極妙

治背癰搭背無名腫毒瘡


用葡萄根搗碎敷患處先用蠶水洗淨後敷上葡萄
根野者妙

又方

以捻拈草用粳米醋調敷患處良

治諸般背疽無名腫毒

用水一椀熬至四分後用好石灰少加七家鍋煤同
下水內調勻用磁器內成收點患處有頭無頭皆可
點之神效



普濟方卷二百八十七